

# Algèbre linéaire

## Bloc 1 – Sciences Mathématiques

## Bloc 2 – Sciences Physiques

*Titulaire* : Michel Rigo  
m.rigo@uliege.be

*Assistant* : Antoine Renard  
antoine.renard@uliege.be

## 0 Espaces vectoriels

### 0.1 *Rappels*<sup>1</sup>

**Définition 0.1** (VII.1.1, p. 121, version 2009-2010). Soit  $\mathbb{K}$  un champ dont le neutre pour l'addition est 0 et le neutre pour la multiplication est 1. Les éléments de  $\mathbb{K}$  sont appelés *scalaires*. Un *espace vectoriel* sur  $\mathbb{K}$  ou  *$\mathbb{K}$ -vectoriel* est un ensemble  $E$  muni d'une opération binaire interne

$$+ : E \times E \rightarrow E$$

et d'une opération interne

$$\cdot : \mathbb{K} \times E \rightarrow E$$

qui jouissent des propriétés suivantes :

- (1)  $(E, +)$  est un groupe commutatif,
- (2) pour tous  $x, y \in E$  et tous scalaires  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$  :
  - (2.1)  $\lambda \cdot (\mu \cdot x) = (\lambda\mu) \cdot x$ , *i.e.* l'opération  $\cdot$  est associative par rapport aux scalaires,
  - (2.2)  $1 \cdot x = x$ , *i.e.* il existe un neutre pour l'opération  $\cdot$ ,
  - (2.3)  $(\lambda + \mu) \cdot x = \lambda \cdot x + \mu \cdot x$ , *i.e.* l'opération  $\cdot$  est distributive par rapport aux scalaires,
  - (2.4)  $\lambda \cdot (x + y) = \lambda \cdot x + \lambda \cdot y$ , *i.e.* l'opération  $\cdot$  est distributive par rapport aux vecteurs.

**Définition 0.2** (VII.3.1, p. 126, version 2009-2010). Soit  $E$  un espace vectoriel. Une partie finie  $A \subset E$  est dite *libre* si les vecteurs de  $A$  sont linéairement indépendants<sup>2</sup>. Dans le cas contraire,  $A$  est dite *liée*. La partie  $A$  est dite *génératrice* si tout vecteur de  $E$  est combinaison linéaire des vecteurs de  $A$ . Si  $x_1, \dots, x_p$  est une partie génératrice de  $E$ , on dit aussi que  $E$  est *engendré* par  $x_1, \dots, x_p$  et on note  $E = \langle x_1, \dots, x_p \rangle$ .

**Définition 0.3** (VII.3.4 et 3.7, p. 127-128, version 2009-2010). Un espace vectoriel  $E$  est dit de *dimension finie* s'il contient une partie génératrice finie. Une *base* de  $E$  est une partie libre et génératrice de  $E$ . La *dimension* de  $E$  est alors le nombre d'éléments d'une base de  $E$ , et est notée  $\dim E$ .

**Définition 0.4** (VII.5.1, p. 133, version 2009-2010). Soit  $E$  un espace vectoriel. Un sous-ensemble non vide  $F \subset E$  est un *sous-espace vectoriel* de  $E$  s'il contient les combinaisons linéaires de ses éléments.

1. Définitions et propositions tirées des notes du cours d'Algèbre linéaire, version 2009–2010, dispensé par Michel Rigo.

2. Pour rappel, des vecteurs  $x_1, \dots, x_p$  sont *linéairement indépendants* si, pour  $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}$ ,

$$\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_p x_p = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \dots = \lambda_p = 0$$

**Proposition 0.5** (VII.5.2, p. 133, version 2009-2010). Soit  $E$  un espace vectoriel sur le champ  $\mathbb{K}$ . Un sous-ensemble  $F \subseteq E$  est un sous-espace vectoriel de  $E$  si, et seulement si, les assertions suivantes sont vérifiées :

- (1)  $0 \in F$ ,
- (2) si  $x, y \in F$ , alors  $x + y \in F$ ,
- (3) si  $x \in F$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$ , alors  $\lambda x \in F$ .

**Proposition 0.6** (VII.5.5, p. 134, version 2009-2010). Soit  $E$  un espace vectoriel de dimension finie  $n$ . Si  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ , alors  $F$  est de dimension finie, inférieure ou égale à  $n$ . De plus, si  $\dim(F) = n$ , alors  $F = E$ .

**Proposition 0.7** (VII.5.7, p. 135, version 2009-2010). Soient  $F$  et  $G$  des sous-espaces vectoriels de  $E$  et soit

$$H = \{f + g \mid f \in F, g \in G\}.$$

Alors  $H$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ . Ce sous-espace  $H$  est appelé la somme de  $F$  et  $G$  et se note  $F + G$ .

**Théorème 0.8** (VII.5.15, p. 137, version 2009-2010). Si  $F$  et  $G$  sont des sous-espaces vectoriels de dimension finie de  $E$ , alors

$$\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G).$$

**Définition 0.9** (VII.5.16, p. 138, version 2009-2010). On dit que la somme  $F + G$  de deux sous-espaces vectoriels  $F$  et  $G$  de  $E$  est *directe* si  $F \cap G = \{0\}$ . Auquel cas, on écrit  $F \oplus G$ .

## 0.2 Exercices au tableau

**Exercice 0.1.** Considérons le  $\mathbb{C}$ -vectoriel  $E_{\mathbb{C}} = \mathbb{C}^3$ .

- (a) Dans  $E_{\mathbb{C}}$ , les vecteurs

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2i \\ 3 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ i \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad v_3 = \begin{pmatrix} 3i \\ -14 \\ 7i \end{pmatrix}$$

sont-ils linéairement indépendants ?

- (b) Montrer que  $E_{\mathbb{C}}$  peut être considéré comme un espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$ .
- (c) Considérons le  $\mathbb{R}$ -vectoriel  $E_{\mathbb{R}} = \mathbb{C}^3$ . Les vecteurs  $v_1, v_2, v_3$  sont-ils linéairement indépendants dans  $E_{\mathbb{R}}$  ?
- (d) Quelle est la dimension de  $E_{\mathbb{C}}$  ? Et celle de  $E_{\mathbb{R}}$  ?

**Exercice 0.2.** Considérons le  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel  $\mathcal{P}_2$  des polynômes de degré inférieur ou égal à 2 à coefficients dans  $\mathbb{R}$ , i.e.  $\mathcal{P}_2 = \mathbb{R}[X]_{\leq 2}$ . Définissons les polynômes

$$P_1(X) = X, \quad P_2(X) = 2X + 1 \quad \text{et} \quad P_3(X) = X^2 + 2X + 2.$$

- (a) Démontrer que les polynômes  $P_1, P_2, P_3$  forment une base de  $\mathcal{P}_2$ .
- (b) Déterminer les composantes des polynômes  $Q_1, Q_2, Q_3$  dans cette base si

$$Q_1(X) = 1, \quad Q_2(X) = X \quad \text{et} \quad Q_3(X) = X^2.$$

- (c) Écrire en général les formules de changement de base établissant le lien entre les composantes des polynômes de  $\mathcal{P}_2$  dans ces deux bases.

**Exercice 0.3.** Soient

$$L = \{p \in \mathbb{C}_{\leq 2}[z] : \forall z \in \mathbb{C}_0, z^2 p\left(\frac{1}{z}\right) = p(z)\}$$

et  $M = \{p \in \mathbb{C}_{\leq 2}[z] : \forall z \in \mathbb{C}, p(z+1) = p(-z)\}$

où  $\mathbb{C}_{\leq 2}[z]$  est l'espace vectoriel des polynômes de degré au plus 2 à coefficients dans  $\mathbb{C}$ .

- (a) Montrer que  $L$  et  $M$  sont des sous-espaces vectoriels de  $\mathbb{C}_{\leq 2}[z]$ .
- (b) Déterminer une base et la dimension de  $L$ ,  $M$ ,  $L \cap M$  et  $L + M$ .

**Exercice 0.4** (Calcul matriciel, Examen Juin 2023). Soit  $E = \mathbb{C}_3^2$  le  $\mathbb{C}$ -vectoriel des matrices complexes  $2 \times 3$ . On considère les sous-vectoriels de  $E$

$$F = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{C} \right\}, \quad G = \left\{ A \in \mathbb{C}_3^2 \mid A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\},$$

$$H = \{A \in \mathbb{C}_3^2 \mid (1 \ 1) A = (0 \ 0 \ 0)\}$$

- (a) Donner une base de  $F$ .
- (b) Donner une base de  $H$ .
- (c) Donner une base de  $F \cap G$ .
- (d) Les sous-espaces  $F$  et  $H$  sont-ils en somme directe ? Justifier. En particulier, a-t-on  $F \oplus H = \mathbb{C}_3^2$  ?
- (e) **Déduire** des points précédents si les espaces  $F \cap G$  et  $H$  sont ou non en somme directe. En particulier, a-t-on  $(F \cap G) \oplus H = \mathbb{C}_3^2$  ?

### 0.3 Exercices en classe

**Exercice 0.5.** Soit  $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$ . On définit les ensembles

$$F = \{X \in \mathbb{R}_2^2 : AX = 0\}, \quad G = \{X \in \mathbb{R}_2^2 : XA = 0\} \quad \text{et} \quad H = \{X \in \mathbb{R}_2^2 : AX = XA\}.$$

- (a) Démontrer que  $F$ ,  $G$  et  $H$  sont des sous-espaces vectoriels de  $\mathbb{R}_2^2$ . Donner ensuite une base et la dimension de chaque sous-espace.
- (b) Décrire  $F \cap G$ ,  $F \cap H$  et  $G \cap H$ . Démontrer que ces trois ensembles sont des sous-espaces vectoriels de  $\mathbb{R}_2^2$ . Donner ensuite une base et la dimension de chaque sous-espace.

**Exercice 0.6** (Calcul matriciel, Examen Janvier 2023). On considère le  $\mathbb{R}$ -vectoriel  $\mathbb{R}^4$ .

- (a) Soit  $F$  l'ensemble des  $(x_1, x_2, x_3, x_4)^\sim \in \mathbb{R}^4$  tels que

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \quad \text{et} \quad 2x_1 - x_3 = 0.$$

Justifier que  $F$  est un sous-espace vectoriel. Quelle en est la dimension ?

- (b) Soit le sous-vectoriel

$$G = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

Donner une base de  $G$ .

- (c) Donner une base de  $F \cap G$ . En déduire la dimension de  $F + G$ .
- (d) Donner un vecteur n'appartenant **pas** à  $F + G$ . Pouvez-vous trouver 2 tels vecteurs linéairement indépendants n'appartenant pas à  $F + G$  ? Justifier.
- (e) L'ensemble  $H$  formé des  $(x_1, x_2, x_3, x_4)^\sim \in \mathbb{R}^4$  tels que  $x_1^2 - x_2^2 = 0$  est-il un sous-espace vectoriel ? Argumenter votre réponse.

**Exercice 0.7.** Soient  $A$  et  $B$  les parties de  $\mathbb{R}^4$  définies par

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 : \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 0 \\ x_3 = x_4^2 + 1 \end{cases} \right\} \quad \text{et} \quad B = \left\{ \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Soient  $F$  et  $G$  les sous-espaces vectoriels engendrés respectivement par  $A$  et  $B$ . Démontrer que  $F = G$ .

**Exercice 0.8** (Examen Janvier 2021). On considère le  $\mathbb{C}$ -vectoriel  $E$  des polynômes à coefficients complexes de degré au plus 4 et le sous-ensemble  $F$  suivant

$$F = \{az^4 + bz^3 + cz^2 + bz + a \mid a, b, c \in \mathbb{C}\}.$$

- (a) Vérifier que  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .
- (b) Donner une base de  $F$  et décomposer  $2z^4 - z^3 - z + 2$  dans celle-ci.
- (c) Quelle est l'intersection de  $F$  avec l'enveloppe linéaire

$$G = \langle z^4 + 1, z^3 + 1, z^2 + 1 \rangle ?$$

En déduire la dimension de  $F + G$ .

- (d) Donner une base d'un supplémentaire de  $F$  dans  $E$ .

**Exercice 0.9** (Partiel Janvier 2014). On se place dans  $\mathbb{R}^4$  considéré comme  $\mathbb{R}$ -vectoriel. On considère l'ensemble

$$F = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} : x_1 + x_2 + x_3 = 0 \text{ et } x_1 - x_2 + x_4 = 0 \right\}$$

et le sous-espace vectoriel

$$G = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

- (a) Vérifier que  $F$  est un sous-espace vectoriel et en donner une base.
- (b)  $F$  et  $G$  sont-ils en somme directe ?
- (c) Trouver un supplémentaire de  $F + G$ .
- (d) Soit  $H$  le sous-espace vectoriel dont une base est donnée par

$$\left( \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right).$$

Donner une base de  $H \cap F$  et une base de  $H + F$ .

**Exercice 0.10.** Soient

$$H_n = \{A \in \mathbb{C}_n^n : A^* = A\} \quad \text{et} \quad U_n = \{A \in \mathbb{C}_n^n : A^* = -A\}.$$

Démontrer, si possible, que ce sont des sous-espaces vectoriels de  $\mathbb{C}_n^n$  et qu'on a  $\mathbb{C}_n^n = H_n \oplus U_n$  lorsque  $\mathbb{C}_n^n$  est vu

- (a) comme un  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel,
- (b) comme un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

**Exercice 0.11.** Considérons  $\mathbb{C}_n^n$  comme un  $\mathbb{C}$ -vectoriel. Soient

$$S_n = \{A \in \mathbb{C}_n^n : \tilde{A} = A\} \quad \text{et} \quad A_n = \{A \in \mathbb{C}_n^n : \tilde{A} = -A\}.$$

Démontrer que ce sont des sous-espaces vectoriels de  $\mathbb{C}_n^n$  et qu'on a  $\mathbb{C}_n^n = S_n \oplus A_n$ .

**Exercice 0.12.** Considérons le  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel  $\mathcal{P}_3$  des polynômes de degré inférieur ou égal à 3 à coefficients dans  $\mathbb{R}$ , *i.e.*  $\mathcal{P}_3 = \mathbb{R}[X]_{\leq 3}$ .

- (a) Démontrer que, pour tout  $a \in \mathbb{R}$ , les polynômes  $1, X - a, (X - a)^2$  et  $(X - a)^3$  forment une base de  $\mathcal{P}_3$ . Dans la suite, nous noterons  $\mathcal{B}$  cette base.
- (b) Rechercher les composantes d'un élément quelconque dans  $\mathcal{B}$ .
- (c) Écrire la formule de changement de base de la base  $\mathcal{B}' = (1, X, X^2, X^3)$  de  $\mathcal{P}_3$  à la base  $\mathcal{B}$ .

**Exercice 0.13.** Soit  $E = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$  considéré comme  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Soient

$$P = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f(-x) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}\} \quad \text{et} \quad I = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f(-x) = -f(x), \forall x \in \mathbb{R}\}.$$

Démontrer que  $E = P \oplus I$ .

**Exercice 0.14.** On considère  $(\mathbb{C}, +, \cdot)$  comme un espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$ .

- (a) À quelle(s) condition(s) sur  $z \in \mathbb{C}$  les éléments  $1$  et  $z$  sont-ils linéairement dépendants sur  $\mathbb{R}$  ?
- (b) À quelle(s) condition(s) sur  $z \in \mathbb{C}_0$  les éléments  $\frac{1}{z}$  et  $1$  sont-ils linéairement dépendants sur  $\mathbb{R}$  ?
- (c) Démontrer que, pour tout  $z \in \mathbb{C}$ , les éléments  $1, z$  et  $z^2$  sont toujours linéairement dépendants sur  $\mathbb{R}$ , et trouver une relation linéaire entre eux.

**Exercice 0.15.** Soit  $\mathcal{B} = (x_1, \dots, x_n)$  une base d'un espace vectoriel  $E$  sur le champ  $\mathbb{K}$ .

- (a) Démontrer que les vecteurs

$$y_1 = x_1, \quad y_2 = x_1 + x_2, \quad \dots, \quad y_n = \sum_{k=1}^n x_k$$

forment une base  $\mathcal{B}'$  de  $E$ .

- (b) Établir la formule de changement de base permettant de passer de  $\mathcal{B}$  à  $\mathcal{B}'$ .

## 1 Polynômes de $\mathbb{C}[z]$

### 1.1 Exercices au tableau

**Exercice 1.1.** Dans  $\mathbb{C}[z]$ , écrire le polynôme  $3z^4 - 2z^2 - 3$  sous la forme de Taylor en le point  $z_0 = -1$ .

**Exercice 1.2** (Interrogation – 5 Mars 2007). Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation

$$x^3 - 7x^2 - 28x + 160 = 0$$

sachant qu'elle admet une solution négative ainsi que deux solutions positives dont l'une est le double de l'autre.

**Exercice 1.3.** Chercher les zéros complexes du polynôme

$$z^3 - 3z^2 + 4z - 12$$

sachant qu'il possède un zéro imaginaire pur.

**Exercice 1.4.** Quels sont les polynômes  $P$  de degré au plus égal à 5 tels que  $P + 10$  soit divisible par  $(z + 2)^3$  et  $P - 10$  soit divisible par  $(z - 2)^3$  ?

**Exercice 1.5.** Soient  $a, b, c \in \mathbb{C}$  et soit  $P \in \mathbb{C}[z]$  défini par

$$P(z) = z^5 + 2z^4 + 6z^3 + az^2 + bz + c.$$

A quelle(s) condition(s) sur les paramètres  $a, b$  et  $c$  le polynôme  $P$  est-il divisible par

- (a)  $z(z - 1)$  ?
- (b)  $(z - 1)^2$  ?

**Exercice 1.6** (Examen Juin 2012). Le polynôme  $z^9 + 2z^5 + 3z^4 + 5z^2 + 6z + 7$  possède-t-il un zéro de module supérieur à 9 ?

**Exercice 1.7.** Démontrer que  $z^{104} + z^{93} + z^{82} + z^{71} + 1$  est divisible par  $z^4 + z^3 + z^2 + z + 1$ .

**Exercice 1.8.** Effectuer la division euclidienne de  $z^5 + 2z^4 - z^3 + 22z$  par  $z^2 - 4z + 1$ .

**Exercice 1.9.** Déterminer des polynômes  $U$  et  $V$  tels que  $(z^7 - z - 1)U + (z^5 + 1)V = 1$ .

### 1.2 Exercices en classe

**Exercice 1.10.** Dans  $\mathbb{C}[z]$ , écrire le polynôme  $2z^3 - 6z^2 + 3z + 5$  sous la forme de Taylor en le point  $z_0 = 2$ .

**Exercice 1.11.** Sachant que le polynôme de  $\mathbb{C}[z]$

$$z^4 + z^3 - 5z^2 + z - 6$$

possède un zéro réel et un zéro imaginaire pur, déterminer tous ses zéros.

**Exercice 1.12.** Chercher les zéros du polynômes de  $\mathbb{C}[z]$

$$z^3 + 3z^2 + (9 - 4i)z + 15$$

sachant qu'il possède un zéro imaginaire pur.

**Exercice 1.13** (Examen Mai 2021). Expliquer pourquoi les zéros du polynôme

$$5z^6 + (1 + 2i)z^4 + (4 - 3i)z^3 + 3z^2 - 2$$

ont tous un module inférieur ou égal à 2.

**Exercice 1.14.** Soient  $a, b, c \in \mathbb{C}$  et soit  $P \in \mathbb{C}[z]$  défini par

$$P(z) = z^5 + 2z^4 + 6z^3 + az^2 + bz + c.$$

A quelle(s) condition(s) sur les paramètres  $a, b$  et  $c$  le polynôme  $P$  est-il divisible par

- (a)  $z^2 + 1$ ?
- (b)  $(z + 1)^3$ ?

**Exercice 1.15.** Effectuer la division euclidienne de  $z^4 + 5z^3 + 12z^2 + 19z - 7$  par  $z^2 + 3z - 1$ .

**Exercice 1.16.** Calculer un pgcd  $D$  de  $z^6 - 7z^4 + 8z^3 - 7z + 7$  et  $3z^5 - 7z^3 + 3z^2 - 7$ . En déduire des polynômes  $U$  et  $V$  tels que

$$(z^6 - 7z^4 + 8z^3 - 7z + 7)U + (3z^5 - 7z^3 + 3z^2 - 7)V = D.$$

**Exercice 1.17.** Vrai–Faux. Justifier à chaque fois votre réponse par une preuve (énoncer un résultat théorique du cours peut suffire) ou un contre-exemple explicite.

- (a) (Examen Août 2023) Dans un plan muni d'un repère orthonormé, par 3 points non alignés de coordonnées  $(x_1, y_1)$ ,  $(x_2, y_2)$  et  $(x_3, y_3)$  avec  $x_1 \leq x_2 \leq x_3$  passe une et une seule parabole d'axe de symétrie vertical.
- (b) (Examen Août 2021) Soit  $P(z)$  un polynôme de degré au moins 2. Le polynôme  $P$  et sa dérivée  $D_z P$  sont toujours premiers entre eux.
- (c) (Examen Août 2021) Soient  $z_0$  un nombre complexe et  $P(z)$  un polynôme de degré au moins 2. Il existe un entier  $j > 0$  tel que  $(D_z^j P)(z_0) \neq 0$ .
- (d) (Examen Mai 2021) Un polynôme  $P \in \mathbb{R}[z]$  de degré 17 possède toujours un zéro réel.

**Exercice 1.18.** Soit  $n \in \mathbb{N}_0 \setminus \{1\}$ . Démontrer que 1 est un zéro triple du polynôme

$$z^{2n} - nz^{n+1} + nz^{n-1} - 1.$$

**Exercice 1.19.** Soient  $a \in \mathbb{R}$  et  $n \in \mathbb{N}_0$ . Calculer le reste de la division de  $(\sin(a) - z \cos(a))^n$  par  $z^2 + 1$ .

**Exercice 1.20** (Interrogation – 18 Février 2013). Soit  $n \geq 2$  un entier. Factoriser  $z^n - 1$  dans  $\mathbb{C}$ . En déduire que  $z^n - 1$  et  $D_z(z^n - 1)$  n'ont pas de zéro commun. Déterminer la valeur du produit suivant

$$\prod_{k=1}^{n-1} e^{2ik\pi/n}.$$

## 2 Fractions rationnelles

### 2.1 *Exercices au tableau*

**Exercice 2.1.** Décomposer en fractions rationnelles simples sur  $\mathbb{C}$  la fraction rationnelle

$$\frac{(2-i)z^3 + (3+4i)z^2 - (4-5i)z - (1+4i)}{(z+i)^3(z-1)}.$$

**Exercice 2.2.** Décomposer en fractions rationnelles simples sur  $\mathbb{R}$  les fractions rationnelles

$$R_1(z) = \frac{z^3 + 3z^2 - 11z + 12}{(z^2 + 1)(z - 2)^2}, \quad R_2(z) = \frac{1}{z(z^4 + 1)} \quad \text{et} \quad R_3(z) = \frac{z^5 + 1}{z^3(z^2 + 1)}.$$

**Exercice 2.3** (Interrogation – 28 Février 2005). Soit  $a \in \mathbb{R}$ . Décomposer en fractions rationnelles simples sur  $\mathbb{R}$  la fraction rationnelle

$$\frac{z^5}{(z^2 + a)^2}.$$

**Exercice 2.4.** Décomposer en fractions rationnelles simples sur  $\mathbb{R}$  la fraction rationnelle

$$\frac{1}{(z+1)(z+2)(z+3)\cdots(z+n)}$$

pour tout  $n \in \mathbb{N}_0$ .

### 2.2 *Exercices en classe*

**Exercice 2.5.** Vrai-Faux. Justifier à chaque fois votre réponse par une preuve (énoncer un résultat théorique du cours peut suffire) ou un contre-exemple explicite.

- (a) (Examen Août 2023) Les fractions  $1/(z^3 - 3z - 2)$  et  $(-3z^2 + 3)/(z^3 - 3z - 2)^2$  possèdent les mêmes pôles.
- (b) (Examen Mai 2023) La fraction  $1/(z^3 - 3z - 2)$  possède le même développement en fractions simples sur  $\mathbb{C}$  et sur  $\mathbb{R}$ .
- (c) (Examen Mai 2022) La fraction

$$\frac{1}{(z^2 + 4)(z - 2)^3}$$

possède les mêmes décompositions en fractions simples sur  $\mathbb{C}$  et sur  $\mathbb{R}$ .

- (d) (Examen Mai 2022) On peut trouver une fraction rationnelle  $R(z)$  telle que  $1+i$  est un pôle de  $R$  mais pas de  $D_z R$ .

**Exercice 2.6.** Décomposer en fractions simples sur  $\mathbb{R}$ , puis sur  $\mathbb{C}$ , les fractions rationnelles suivantes :

$$R_1(z) = \frac{1}{z^3 - z}, \quad R_2(z) = \frac{z^4 + 1}{(z+1)^2(z^2 + 1)} \quad \text{et} \quad R_3(z) = \frac{z^2 + 3z + 1}{(z-1)^2(z-2)}.$$

**Exercice 2.7** (Examen Juin 2019). Décomposer en fractions simples sur  $\mathbb{R}$ , **puis sur**  $\mathbb{C}$ , la fraction rationnelle suivante

$$\frac{4z^3 + 13z^2 + 14z + 13}{z^4 + 2z^3 + 4z^2 + 6z + 3}.$$

*Suggestion* : le dénominateur possède un zéro réel et deux zéros dans  $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ .

**Exercice 2.8** (Examen Septembre 2021). Décomposer en fractions simples sur  $\mathbb{R}$ , **puis sur**  $\mathbb{C}$ , la fraction rationnelle suivante

$$\frac{-x^3 + 7x^2 - 5x + 7}{(x-1)^2(x^2 + 1)}.$$

**Exercice 2.9** (Examen Mai 2022). Sachant que  $x^4 - 4x^3 - 2x^2 + 12x + 9 = (x - 3)^2(x + 1)^2$ . Exprimer la fraction rationnelle suivante

$$\frac{3x^6 - 12x^5 - 5x^4 + 38x^3 + 15x^2 - 2x + 27}{x^4 - 4x^3 - 2x^2 + 12x + 9}$$

comme somme d'un polynôme et d'une fraction rationnelle propre que l'on décomposera ensuite en fractions simples (sur  $\mathbb{R}$ ). Donner la forme de cette décomposition avec des constantes indéterminées puis, fournir un système permettant de déterminer ces constantes. On ne demande **pas** de le résoudre.

**Exercice 2.10.** Décomposer en fractions rationnelles simples sur  $\mathbb{R}$  les fractions rationnelles

$$R_{m,n}(z) \frac{z^m}{(z-1)^n} \quad \text{et} \quad R_n(z) = \frac{z^{n-1}}{z^n - 1},$$

pour tout  $m, n \in \mathbb{N}_0$ .

### 3 Opérateurs linéaires I

#### 3.1 Exercices au tableau

**Exercice 3.1.** Les applications suivantes sont-elles linéaires ? Justifier.

- (a)  $T_1: \mathbb{R}^2 \rightarrow [-1, 1] : (x, y) \mapsto \sin(x + y)$ .
- (b)  $T_2: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 : (x, y, z) \mapsto (x + 2y, -z)$ .
- (c)  $T_3: \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2 : (x, y) \mapsto (\overline{x + y}, x + iy)$ , où  $\mathbb{C}^2$  est vu comme  $\mathbb{R}$ -vectoriel.

**Exercice 3.2.** Pour  $\alpha \in \mathbb{R}$ , montrer que l'application

$$U: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 : \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

est linéaire et qu'il s'agit d'un isomorphisme.

**Exercice 3.3.** Soit

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Montrer que l'application  $T: \mathbb{C}_{\leq 3}[z] \rightarrow \mathbb{C}_3^3 : P \mapsto P(M)$  est linéaire. Donner des bases des image et noyau.

**Exercice 3.4.** On pose  $P_0(z) = z^2 + z$ ,  $P_1(z) = z^2 + 1$ ,  $P_2(z) = z + 1$ .

- (a) Montrer que  $P_0, P_1, P_2$  forment une base de  $\mathbb{C}_{\leq 2}[z]$  et donner les composantes de  $az^2 + bz + c$  dans cette base.
- (b) On définit  $T \in \mathcal{L}(P_2, \mathbb{C})$  par  $TP_0 = TP_1 = TP_2 = 2$ . Quelle est l'image de  $az^2 + bz + c$  ?
- (c) Déterminer  $\text{Ker } T$  et montrer qu'il existe  $z_0 \in \mathbb{C}$  tel que

$$\text{Ker } T = \{P \in \mathbb{C}_{\leq 2}[z] : P(z_0) = 0\}.$$

**Exercice 3.5.** Soient  $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$  et  $T: \mathbb{C}_2^2 \rightarrow \mathbb{C}_2^2 : A \mapsto AM - MA$ . Donner la matrice qui représente  $T$  dans la base canonique.

**Exercice 3.6.** Montrer qu'il existe un unique endomorphisme  $T$  de  $\mathbb{R}^4$  tel que, si  $(e_1, e_2, e_3, e_4)$  désigne la base canonique, alors on a

$$\begin{cases} T(e_1) = e_1 - e_2 + e_3 \\ T(2e_1 + 3e_4) = e_2 \end{cases} \quad \text{et} \quad \text{Ker } T = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, x + 2y + z = 0 \text{ et } x + 3y - t = 0\}.$$

**Exercice 3.7.** Pour tout  $P \in \mathbb{R}_{\leq 3}[x]$ , on pose

$$f(P) = \begin{pmatrix} P(1) \\ (D_x P)(1) \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad g(P) = P + (x - 1)D_x P - P(1).$$

- (a) Montrer que  $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_{\leq 3}[x], \mathbb{R}^2)$  et que  $g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_{\leq 3}[x])$ .
- (b) Donner leurs représentations matricielles dans les bases canoniques

$$\mathcal{B} = \{1, x, x^2, x^3\} \quad \text{et} \quad \mathcal{C} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

- (c) Soit la base  $\mathcal{B}' = \{1, x - 1, (x - 1)^2, (x - 1)^3\}$  de  $\mathbb{R}_{\leq 3}[x]$ . Donner les matrices de changement de base entre  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{B}'$ . En déduire les matrices représentant  $f$  et  $g$  dans les bases  $\mathcal{B}'$  et  $\mathcal{C}$ .
- (d) Donner des bases de  $\text{Im}(f)$ ,  $\text{Ker}(f)$ ,  $\text{Im}(g)$  et  $\text{Ker}(g)$ .
- (e) Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , calculer  $g^n$ .

**Exercice 3.8.** Pour tout  $P \in \mathbb{C}_{\leq 3}[z]$ , on pose

$$f(P) = P(1 - z) + P(1) - P(z) \quad \text{et} \quad g(P) = \frac{1}{4!} D_z^3(P(z^2)) - z D_z P(z) + z^3 P\left(\frac{1}{z}\right).$$

- Montrer que  $f, g \in \mathcal{L}(\mathbb{C}_{\leq 3}[z])$ .
- Donner les matrices qui représentent  $f$  et  $g$  dans la base canonique. En déduire les matrices qui représentent  $f \circ g$  et  $g \circ f$ .
- Soit  $Q(z) = z(1 - z)$ . Calculer  $(f \circ g)(Q)$  et  $(g \circ f)(Q)$ .
- Donner des bases des noyaux et images de  $f \circ g$  et  $g \circ f$ .
- A-t-on  $\text{rg}(f \circ g) = \text{rg}(g \circ f)$  ?

### 3.2 Exercices en classe

**Exercice 3.9.** Les applications suivantes sont-elles linéaires ? Justifier.

- $T_1: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto x^2 - y^2$ .
- $T_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 : (x, y) \mapsto (x + y, x - y, 1)$ .
- $T_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 : (x, y) \mapsto (x + y, x - y, 0)$ .

**Exercice 3.10.** Soient  $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$  et  $T: \mathbb{C}_2^2 \rightarrow \mathbb{C}_2^2 : A \mapsto AM - MA$ .

- Montrer que  $T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}_2^2)$ .
- Trouver des bases et les dimensions des noyau et image.

**Exercice 3.11.** On considère l'endomorphisme

$$T: \mathbb{C}_{\leq 3}[z] \rightarrow \mathbb{C}_{\leq 3}[z] : P(z) \mapsto D_z((1 - z^2)D_z P(z)) + 6P(z).$$

Déterminer  $\text{Ker } T$  et  $\text{Im } T$ .

**Exercice 3.12.** Soit  $E = \mathbb{R}^4$  et  $F = \mathbb{R}^2$ . On considère

$$H = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x = y = z = t\}.$$

Existe-t-il des applications linéaires de  $E$  dans  $F$  dont le noyau est  $H$  ?

**Exercice 3.13.** Vrai–Faux. Justifier à chaque fois votre réponse par une preuve (énoncer un résultat théorique du cours peut suffire) ou un contre-exemple explicite.

- (Examen Août 2021) Soit  $T$  une application linéaire. Si  $\dim(\text{Im } T) = \dim(\text{Ker } T)$ , alors  $T$  est injective. Cette affirmation est-elle vraie ou fausse ? Justifier.
- (Examen Août 2023) Soit  $A$  une matrice de  $\mathbb{C}_4^3$  de rang 2. Il existe deux vecteurs linéairement indépendants  $x, y$  de  $\mathbb{C}^4$  tels que  $Ax = 0 = Ay$ .

**Exercice 3.14** (Examen Août 2023). Soient  $u_1, u_2, u_3, u_4$  une base d'un espace vectoriel  $E$  (de dimension 4) et  $T$  un endomorphisme de  $E$ . La matrice  $M$  qui représente  $T$  dans cette base est telle que si  $i \geq j$ , alors  $M_{i,j} = 0$ . Quels renseignements tirez-vous sur  $Tu_k$  pour  $k = 1, 2, 3, 4$  ? Rappelez le résultat théorique utilisé. Démontrer ensuite que pour tout  $x \in E$ ,  $T^4 x = 0$ .

**Exercice 3.15** (Examen Mai 2023). Soient  $u_1, u_2, u_3, u_4$  une base d'un espace vectoriel  $E$  (de dimension 4) et  $T$  un endomorphisme de  $E$  tel que

$$T(u_1) \in \rangle u_1, u_2 \langle, \quad T(u_2) \in \rangle u_1, u_2 \langle, \quad T(u_3) \in \rangle u_3, u_4 \langle \quad \text{et} \quad T(u_4) \in \rangle u_3, u_4 \langle.$$

Quels renseignements pouvez-vous tirer sur la matrice représentant  $T$  dans cette base ? En particulier, quels éléments de la matrices sont nécessairement nuls ? Rappelez le résultat théorique utilisé.

**Exercice 3.16.** Soient  $A, B$  deux polynômes de degré  $n + 1$ . On définit l'application  $T : \mathcal{R}_n \rightarrow \mathcal{R}_n$  qui à un polynôme  $P$  associe le reste de  $AP$  dans la division euclidienne par  $B$ .

- Démontrer que  $T$  est linéaire.
- Démontrer que  $T$  est bijectif si et seulement si  $A$  et  $B$  sont premiers entre eux.

**Exercice 3.17** (Examen Août 2021). On considère l'application linéaire

$$T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_2 + x_3 \\ x_1 + x_4 \\ x_2 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 \end{pmatrix}$$

- Dans la base canonique  $(e_1, e_2, e_3, e_4)$  de  $\mathbb{R}^4$ , représenter  $T$ .
- Dans la base  $(e_1 - e_2, e_1 + e_2, e_3 - e_4, e_3 + e_4)$  de  $\mathbb{R}^4$ , représenter  $T$ .
- Donner une base du noyau de  $T$ , une base de l'image de  $T$ . Vérifier le théorème de la dimension.
- $T$  est-il un isomorphisme de  $\mathbb{R}^4$  dans lui-même ? Justifier votre réponse.

**Exercice 3.18** (Examen Juin 2019). On considère une base  $U = (u_1, u_2, u_3)$  de  $\mathbb{R}^3$  et l'endomorphisme  $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  défini par

$$\begin{aligned} T(u_1) &= u_1 + 2u_2, \\ T(u_2) &= u_1 + 3u_2 + u_3, \\ T(u_3) &= u_2 + u_3. \end{aligned}$$

- Calculer  $T(u_1 + u_2 + u_3)$ .
- Représenter matriciellement  $T$  dans la base  $U$ .
- Soient les éléments  $w_1 = -u_1 + 2u_3$ ,  $w_2 = u_1 + u_3$ ,  $w_3 = u_2$  (il est acquis que ces vecteurs forment une base). Représenter matriciellement  $T$  dans cette base  $(w_1, w_2, w_3)$ .
- Fournir une base de  $\text{Ker } T$ . En déduire la dimension de l'image de  $T$ .

**Exercice 3.19** (Examen Septembre 2014). Dans  $\mathbb{R}^3$ , on considère  $u_1 = (1, 0, -1)^\sim$ ,  $u_2 = (0, 2, 3)^\sim$  et  $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$  tel que  $Tu_1 = (2, 1, 0)^\sim$  et  $Tu_2 = (1, 0, 1)^\sim$ .

- Choisir un vecteur  $u_3$  tel que  $U = (u_1, u_2, u_3)$  soit une base de  $\mathbb{R}^3$  (on gardera cette base tout au long de l'exercice). Dans cette base, donner  $\Phi_U(Tu_1)$  et  $\Phi_U(Tu_2)$ .
- Soit l'ensemble  $E$  formé des vecteurs  $v \in \mathbb{R}^3$  tels que  $Tu_3 = v$  et le rang de  $T$  vaut 2. Exhiber un élément appartenant à  $E$ . Cet ensemble est-il un sous-espace vectoriel ? Si oui, quelle en est sa dimension ?
- Fournir un vecteur  $w$  tel que  $Tu_3 = w$  et  $T$  est un isomorphisme.
- Si  $Tu_3 = (5, 3, -1)^\sim$ , représenter matriciellement  $T$  dans la base  $U$  et donner une base du noyau de  $T$ .

**Exercice 3.20.** Le but de l'exercice est d'étudier l'opérateur  $\Delta : \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R}[x]$  défini par  $(\Delta P)(x) = P(x + 1) - P(x)$ .

- Question préliminaire : Soit  $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de  $\mathbb{R}[x]$  telle que  $\deg(P_n) = n$  pour chaque  $n$ . Prouver que  $(P_n)_n$  est une base de  $\mathbb{R}[x]$ .
- Montrer que  $\Delta$  est une application linéaire. Calculer son noyau et son image.
- Montrer qu'il existe une unique famille  $(H_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de  $\mathbb{R}[x]$  telle que

$$H_0 = 1, \quad \Delta(H_n) = H_{n-1} \quad \text{et} \quad H_n(0) = 0.$$

Montrer que  $(H_n)_n$  est une base de  $\mathbb{R}[x]$ .

(d) Soit  $P$  un polynôme réel de degré  $p \in \mathbb{N}$ . Montrer que  $P$  peut s'écrire

$$P = \sum_{n=0}^p (\Delta^n P)(0) H_n.$$

(e) Montrer que l'on a

$$(\Delta^n P)(0) = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} P(k).$$

(f) Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}_0$ ,

$$H_n = \frac{x(x-1) \cdots (x-n+1)}{n!}.$$

(g) En déduire que pour tout polynôme  $P$  de degré  $p$ , les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i)  $P$  prend des valeurs entières sur  $\mathbb{Z}$ .
- (ii)  $P$  prend des valeurs entières sur  $\{0, \dots, p\}$ .
- (iii) Les coordonnées de  $P$  dans la base  $(H_n)_n$  sont des entiers.
- (iv)  $P$  prend des valeurs entières sur  $p+1$  entiers consécutifs.

## 4 Opérateurs linéaires II

### 4.1 Exercices au tableau

**Exercice 4.1.** Soit  $E$  un espace vectoriel et  $T, S \in \mathcal{L}(E)$ . On suppose que  $T \circ S = S \circ T$ . Démontrer que  $\text{Ker } T$  et  $\text{Im } T$  sont stables par  $S$ , *i.e.*

$$S(\text{Ker } T) \subset \text{Ker } T \quad \text{et} \quad S(\text{Im } T) \subset \text{Im } T.$$

**Exercice 4.2.** Si  $E$  est un espace vectoriel de dimension finie et si  $T \in \mathcal{L}(E)$ , montrer que

$$\text{Im } T = \text{Ker } T \Leftrightarrow (T^2 = 0 \quad \text{et} \quad 2 \cdot \dim(\text{Im } T) = \dim(E)).$$

**Exercice 4.3.** Soient  $E$  un espace vectoriel réel de dimension 2 et  $T \in \mathcal{L}(E)$  tel que  $T^2 = -\text{id}$ . Montrer que  $x \in E \setminus \{0\}$  et  $Tx$  forment une base.

**Exercice 4.4.** Soient  $E$  un espace vectoriel de dimension finie et  $T \in \mathcal{L}(E)$  un opérateur *involutif* (*i.e.*  $T^2 = \text{id}$ ). Démontrer que  $\text{Ker}(T - \text{id}) = \text{Im}(T + \text{id})$ .

**Exercice 4.5.** Soient  $E$  et  $F$  deux espaces vectoriels,  $T \in \mathcal{L}(E, F)$  et  $S \in \mathcal{L}(F, E)$  vérifiant

$$T \circ S \circ T = T \quad \text{et} \quad S \circ T \circ S = S.$$

Démontrer que  $\text{Ker } T$  et  $\text{Im } S$  sont supplémentaires.

### 4.2 Exercices en classe

**Exercice 4.6.** Soient  $E, F, G$  trois  $\mathbb{K}$ -vectoriels, et soient  $f \in \mathcal{L}(E, F)$  et  $g \in \mathcal{L}(F, G)$ . Montrer que

$$g \circ f = 0 \Leftrightarrow \text{Im } f \subset \text{Ker } g.$$

**Exercice 4.7** (Examen Mai 2022). Donner *un exemple* d'application linéaire  $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  distincte de l'identité et de l'application nulle telle que  $T^2 = T$ . Justifier votre construction.

**Exercice 4.8** (Examen Mai 2021). Donner *un exemple* d'application linéaire  $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$  telle que  $\dim(\text{Im } T) = \dim(\text{Ker } T) = 2$ . Justifier votre construction.

**Exercice 4.9.** Soit  $E$  un espace vectoriel et  $T \in \mathcal{L}(E)$ . Montrer que  $\text{Ker}(T)$ ,  $\text{Ker}(T - \text{id})$  et  $\text{Ker}(T + \text{id})$  sont en somme directe.

**Exercice 4.10.** Soient  $E$  un espace vectoriel de dimension finie et  $T \in \mathcal{L}(E)$  un opérateur *involutif* (*i.e.*  $T^2 = \text{id}$ ). Démontrer que

$$\begin{aligned} \text{Ker}(T + \text{id}) &= \text{Im}(T - \text{id}) \\ E &= \text{Ker}(T - \text{id}) \oplus \text{Ker}(T + \text{id}). \end{aligned}$$

Réciproquement, montrer qu'à toute décomposition  $E = A \oplus B$  correspond une unique involution  $T$  telle que  $A = \text{Ker}(T - \text{id})$  et  $B = \text{Ker}(T + \text{id})$ .

**Exercice 4.11.** Soit  $E$  un espace vectoriel et  $T \in \mathcal{L}(E)$  tel que, pour tout  $x \in E$ , les vecteurs  $x$  et  $Tx$  sont linéairement dépendants.

- Démontrer que pour tout  $x \in E \setminus \{0\}$ , il existe un unique scalaire  $\lambda_x$  tel que  $Tx = \lambda_x x$ .
- Montrer que  $\lambda_x = \lambda_y$  lorsque  $x$  et  $y$  sont linéairement dépendants.
- Montrer que  $\lambda_x = \lambda_y$  lorsque  $x$  et  $y$  sont linéairement indépendants.
- En déduire que  $T$  est une homothétie, *i.e.* il existe un scalaire  $\lambda$  tel que  $Tx = \lambda x$  pour tout  $x \in E$ .

## 5 Diagonalisation I

### 5.1 Exercices au tableau

**Exercice 5.1.** Soit

$$A = \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ 6 & -2 \end{pmatrix}.$$

Montrer que  $A$  est diagonalisable et calculer ses valeurs propres. En déduire qu'il existe une matrice  $B$  telle que  $B^3 = A$ .

**Exercice 5.2.** Diagonaliser, si possible, les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si  $A$  (resp.  $B$ ) est diagonalisable, en déduire  $A^n$  (resp.  $B^n$ ) pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

**Exercice 5.3.** Pour quelle(s) valeur(s) du complexe  $\alpha$ , les matrices

$$M = \begin{pmatrix} \alpha & 2\alpha & -\alpha \\ -2 & -\alpha & 2 \\ -1 & 2\alpha & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad N = \begin{pmatrix} -1 & 2\alpha & 3 \\ -2 & 2 & 2 \\ 1 & 2\alpha & 1 \end{pmatrix}$$

sont-elles diagonalisables ?

**Exercice 5.4.** Déterminer si les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

sont semblables.

**Exercice 5.5.** Soit la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Diagonaliser  $A$  et en déduire toutes les matrices  $M$  qui commutent avec  $A$ .

**Exercice 5.6.** Soit la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- Calculer  $A^2$  et en déduire une relation simple liant  $A^2$ ,  $A$  et  $I_4$ .
- En déduire que  $A$  est diagonalisable et donner ses valeurs propres.
- Diagonaliser  $A$ .

### 5.2 Exercices en classe

**Exercice 5.7.** Diagonaliser, si possible, la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -1 & -1 \\ 2 & 4 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 4 & -2 \\ -1 & 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Si elle est diagonalisable, en déduire  $A^n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

**Exercice 5.8** (Examen Juin 2010). Diagonaliser, si possible, les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Si  $M \in \{A, B\}$  est diagonalisable, fournir explicitement une matrice  $S$  qui diagonalise  $M$  et la matrice diagonale  $S^{-1}MS$  correspondante.

**Exercice 5.9.** Vrai–Faux. Justifier à chaque fois votre réponse par une preuve (énoncer un résultat théorique du cours peut suffire) ou un contre-exemple explicite.

(a) (Examen Août 2023) Soit  $A$  une matrice de  $\mathbb{C}_2^2$ . Son polynôme caractéristique est donné par

$$\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - \operatorname{tr}(A) \cdot \lambda + \det(A),$$

où  $\operatorname{tr}(A)$  dénote la trace de  $A$ .

- (b) (Examen Mai 2023) Soient  $A, B$  deux matrices diagonalisable par une même matrice  $S$ . Alors  $AB = BA$ .
- (c) (Examen Mai 2023) Une matrice carrée est inversible si et seulement si elle ne possède pas de valeur propre nulle.
- (d) (Examen Mai 2022) Les valeurs propres d'une matrice  $3 \times 3$  à coefficients entiers sont réelles.
- (e) (Examen Septembre 2021) Toute matrice de  $\mathbb{C}_2^2$  est diagonalisable.

**Exercice 5.10** (Examen Mai 2023). Soit  $A$  une matrice carrée de dimension  $5 \times 5$  à coefficients réels ayant  $2, 1 + i$  et  $3 - i$  comme valeurs propres. Peut-on déterminer l'ensemble des valeurs propres de  $A$ ? Justifier.

**Exercice 5.11** (Examen Juin 2013). A quelles conditions sur les paramètres  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$  la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \beta & \gamma \\ 0 & 1 & \alpha & \beta \\ 0 & 0 & -1 & \alpha \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

est-elle diagonalisable? Quand  $M$  est diagonalisable, fournir une matrice inversible  $S$  telle que  $S^{-1}MS$  soit diagonale.

**Exercice 5.12** (Examen Août 2023). On considère la matrice

$$\begin{pmatrix} 8 + 2\alpha & 2\alpha & -2 + 2\alpha \\ -1 - \alpha & 6 - 4\alpha & 1 - 7\alpha \\ -1 + 2\alpha & 2\alpha & 7 + 2\alpha \end{pmatrix}$$

qui est telle que

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = -\lambda^3 + 21\lambda^2 - 144\lambda + 324.$$

- (a) Vérifier que les valeurs propres de  $A$  sont 6 et 9. Donner leur multiplicité algébrique.
- (b) Pour quelle(s) valeur(s) du paramètre  $\alpha \in \mathbb{C}$ , la matrice  $A$  est-elle diagonalisable?
- (c) Quand  $A$  est diagonalisable, fournir une matrice inversible  $S$  telle que  $S^{-1}AS$  soit diagonale. Fournir la matrice  $S^{-1}AS$  correspondante.

**Exercice 5.13.** Soit  $A$  une matrice complexe diagonalisable de taille  $n \times n$  et soit  $B$  la matrice définie par

$$B = \left( \begin{array}{c|c} 0 & A \\ \hline I_n & 0 \end{array} \right).$$

Donner les valeurs propres de  $B$  et la dimension des sous-espaces propres correspondants. A quelle condition  $B$  est-elle diagonalisable?

**Exercice 5.14** (Examen Mai 2022). Soient  $\phi \in \mathbb{R}$  un paramètre et la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 & 0 \\ \phi & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & \phi & 1 \end{pmatrix}.$$

- (a) Pour quelle(s) valeur(s) de  $\phi$ , la matrice  $M$  ne possède-t-elle que des valeurs propres simples ?  
 (b) Pour quelle(s) valeur(s) de  $\phi$ , la matrice  $M$  est-elle diagonalisable ? (On ne demande **pas** de diagonaliser.)  
 (c) Soient les vecteurs

$$x = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad y = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Pour quelle(s) valeur(s) de  $\phi$ ,  $x$  est-il un vecteur propre de  $M$  ? Justifier que  $y$  n'est jamais vecteur propre de  $M$ .

**Exercice 5.15.** Soit la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & -\alpha & 0 \\ 0 & \alpha + 1 & 0 & 2 - 2\alpha \\ 2 - \alpha & \alpha - 2 & 3 & 2 - 2\alpha \\ 0 & 0 & 0 & 3 - \alpha \end{pmatrix}.$$

On donne (inutile de le vérifier)

$$\det(A - \lambda I) = (\lambda - \alpha - 1)^2(\lambda - 3 + \alpha)^2$$

- (a) Montrer que pour  $\alpha = 0$  et  $\alpha = 2$ , les matrices correspondantes ont les mêmes valeurs propres avec les mêmes multiplicités algébriques.  
 (b) Pour quelle(s) valeur(s) de  $\alpha \in \mathbb{C}$ , la matrice  $A$  possède-t-elle une unique valeur propre (de multiplicité algébrique 4) ? Dans ce(s) cas,  $A$  est-elle diagonalisable ?  
 (c) Pour  $\alpha = 0$ , si possible, diagonaliser  $A$ .  
 (d) En exploitant le point précédent, pour  $\alpha = 0$ , vérifier que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{\left(\frac{A}{3}\right)^n}_u \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

*Suggestion* : plusieurs méthodes de résolution sont possibles, il n'est pas nécessaire de réaliser un calcul du type  $S^{-1}$ , on peut aussi décomposer le vecteur colonne  $u$  dans une base formée de vecteurs propres.

- (e) Toujours pour  $\alpha = 0$ , justifier que  $P(z) = z^2 - 4z + 3$  est le polynôme minimum de  $A$  (i.e., polynôme de plus petit degré annulé par  $A$ ).

**Exercice 5.16.** Pour  $n \geq 1$ , soit

$$A_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & 1 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

et  $P_n(x) = \det(xI_n - A_n)$  son polynôme caractéristique.

(a) Démontrer que, pour tout  $n \geq 2$ , on a

$$P_n(x) = xP_{n-1}(x) - P_{n-2}(x).$$

Calculer  $P_1$  et  $P_2$ .

(b) Pour tout  $\alpha \in ]0, \pi[$ , on pose  $x_\alpha = 2 \cos \alpha$ . Démontrer que

$$P_n(x_\alpha) = \frac{\sin((n+1)\alpha)}{\sin \alpha}.$$

(c) En déduire que  $A_n$  est diagonalisable.

## 6 Diagonalisation II

### 6.1 Exercices au tableau

**Exercice 6.1.** Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{pmatrix}.$$

- Déterminer, sans calculer le polynôme caractéristique, les valeurs propres de la matrice  $A$ . Est-elle diagonalisable ?
- Plus généralement, donner une condition nécessaire et suffisante pour qu'une matrice de rang 1 soit diagonalisable.

**Exercice 6.2.** Chercher les valeurs propres de l'opérateur

$$T: \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}) : f \mapsto Df$$

ainsi que les sous-espaces propres associés.

**Exercice 6.3.** Soit  $E = \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$  le  $\mathbb{C}$ -vectoriel des suites à coefficients complexes, et  $T$  l'endomorphisme de  $E$  qui à une suite  $(u_n)_n$  associe la suite  $(v_n)_n$  définie par  $v_0 = u_0$  et, pour tout  $n \geq 1$ ,

$$v_n = \frac{u_n + u_{n-1}}{2}.$$

Déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de  $T$ .

**Exercice 6.4.** Chercher les valeurs propres de l'opérateur

$$T: \mathbb{C}_{\leq n}[z] \rightarrow \mathbb{C}_{\leq n}[z] : p \mapsto (z^2 - 1)D^2p(z) + (2z + 1)Dp(z)$$

après avoir vérifié que ce dernier est bien linéaire.

**Exercice 6.5.** Soient  $A$  et  $B$  deux matrices de  $\mathbb{C}_n^n$ . Prouver que si les valeurs propres de  $A$  sont simples et que  $B$  commute avec  $A$ , alors  $B$  est diagonalisable.

### 6.2 Exercices en classe

**Exercice 6.6** (Examen Mai 2023). Soit  $E = \{ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$  le  $\mathbb{R}$ -vectoriel des polynômes de degré au plus 2. On considère l'application linéaire dérivée  $D: E \rightarrow E$ . L'unique valeur propre de  $D$  est zéro. Cette affirmation est-elle vraie ou fausse ? Justifier.

**Exercice 6.7.** Chercher les valeurs propres de l'opérateur

$$S: \mathbb{R}_{\leq n}[x] \rightarrow \mathbb{R}_{\leq n}[x] : p \mapsto \frac{1}{x-1} \int_1^x p(t) dt.$$

après avoir vérifié que ce dernier est bien linéaire. Lorsque  $n = 2$ , trouver une base  $\mathcal{B}$  de  $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$  telle que la matrice qui représente  $S$  dans  $\mathcal{B}$  soit diagonale.

**Exercice 6.8.** Soit  $T$  l'endomorphisme de  $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$  défini par  $T(P)(x) = x^n P(1/x)$ . Démontrer que  $T$  est un endomorphisme diagonalisable de  $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ , déterminer ses valeurs propres et une base de vecteurs propres associés.

*Suggestion :* Calculer  $T^2P$  pour un polynôme quelconque  $P \in \mathbb{R}_{\leq n}[x]$ , et en déduire un polynôme annulateur de  $T$ .

**Exercice 6.9** (Examen Août 2023). On considère l'application linéaire

$$T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 2x_1 - x_2 + x_3 - x_4 \\ 2x_2 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \\ -x_1 - x_3 + 2x_4 \end{pmatrix}.$$

- (a) Dans la base canonique  $(e_1, e_2, e_3, e_4)$  de  $\mathbb{R}^4$ , représenter  $T$ .
- (b) Dans la base de  $\mathbb{R}^4$
- $$(e_1 - e_4, e_2 - e_4, e_1 - e_2 - e_3, e_1 - e_3),$$
- représenter  $T$ .
- (c) Donner les valeurs propres de  $T$  et leurs multiplicités géométriques respectives.
- (d) Donner une base du noyau de  $T$ , une base de l'image de  $T$ . Vérifier le théorème de la dimension.
- (e)  $T$  est-il un isomorphisme de  $\mathbb{R}^4$  dans lui-même ? Justifier votre réponse.

**Exercice 6.10** (Examen Mai 2022). Soit  $E$  un  $\mathbb{C}$ -vectoriel ayant  $U = (u_1, u_2, u_3, u_4)$  comme base. On considère l'endomorphisme  $T \in \mathcal{L}(E)$  défini par

$$Tu_1 = u_1 + u_2, \quad Tu_2 = 2u_1 + u_2, \quad Tu_3 = 3u_3 + 2u_4 \quad \text{et} \quad Tu_4 = 3u_4.$$

- (a) Représenter matriciellement  $T$  dans la base  $U$ .
- (b) Quelles sont les valeurs propres de  $T$  ainsi que leurs multiplicités algébrique et géométrique respectives ?
- (c) Représenter matriciellement  $T^2 - \text{id}$  dans la base  $U$  ; déduire du point précédent les valeurs propres de  $T^2 - \text{id}$ .
- (d) Soit la base

$$V = (w_1 = u_1 + u_2 ; w_2 = u_1 - u_2 ; w_3 = u_3 + u_4 ; w_4 = u_3 - u_4).$$

Représenter matriciellement  $T$  dans la base  $V$ .

- (e) Déterminer l'image et le noyau de  $T$ . Que pouvez-vous conclure (injection, surjection, bijection) ?

## 7 Diagonalisation et polynômes d'endomorphisme

### 7.1 Exercices au tableau

**Exercice 7.1.** Soit  $n \geq 1$  et  $A \in \mathbb{R}_n^n$ .

- Démontrer que si  $\omega$  est une valeur propre de  $A$  de multiplicité  $s$ , alors  $\bar{\omega}$  est une valeur propre de  $A$  de multiplicité  $s$ .
- On suppose que  $A^3 - 3A - 4I_n = 0$ . Montrer que  $A$  est de déterminant strictement positif.
- On suppose que  $A^2 + A + I_n = 0$ . Montrer que  $n$  est pair.
- On suppose que  $A^3 + A^2 + A = 0$ . Montrer que le rang de  $A$  est pair.
- On suppose que  $A^3 + A^2 + A = 0$ . Démontrer que  $\text{tr}(A)$  est un entier négatif.

**Exercice 7.2.** Soit  $A = \text{diag}(A_1, \dots, A_k)$  où les  $A_i$  sont des matrices complexes carrées. Prouver que le polynôme minimum de  $A$  est égal au ppcm de celui des  $A_i$  pour  $i \in \{1, \dots, k\}$ .

**Exercice 7.3.** Soit  $A \in \mathbb{C}_n^n$  tel que  $A^3 + I = 0$  et  $\text{tr}(A) = \det(A) = -1$ . Déterminer le polynôme caractéristique de  $A$ .

**Exercice 7.4.** Déterminer le polynôme minimum des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

**Exercice 7.5.** Soit  $E$  un espace vectoriel de dimension  $n$  sur un champ  $\mathbb{K}$  et  $T$  un endomorphisme de  $E$ . Montrer que si  $x \in E$  est tel que  $x, Tx, \dots, T^{n-1}x$  est une base de  $E$ , alors le polynôme minimum et le polynôme caractéristique de  $T$  coïncident (à multiplication par  $-1$  près).

**Exercice 7.6.** Soit  $T$  un endomorphisme d'un  $\mathbb{K}$ -vectoriel  $E$  de dimension finie, et soit  $\mathcal{M}_T$  son polynôme minimal. Soit  $P$  un polynôme à coefficients dans  $\mathbb{K}$ . Démontrer que  $P(T)$  est inversible si et seulement si  $P$  et  $\mathcal{M}_T$  sont premiers entre eux.

**Exercice 7.7.** Soit  $n \geq 1$ . Déterminer les polynômes minimum et caractéristique de l'application

$$S: \mathbb{C}_{\leq n}[z] \rightarrow \mathbb{C}_{\leq n}[z] : p \mapsto p(z+1).$$

### 7.2 Exercices en classe

**Exercice 7.8.** Déterminer le polynôme minimum des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 8 \\ 3 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & -5 \end{pmatrix}.$$

**Exercice 7.9.** Soit

$$T: \mathbb{C}_2^2 \rightarrow \mathbb{C}_2^2 : \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 2c & a+c \\ b-2c & d \end{pmatrix}.$$

- Déterminer les valeurs propres et les espaces propres associés de  $T$ .
- L'opérateur  $T$  est-il diagonalisable ?
- Déterminer le polynôme minimum de  $T$ .

**Exercice 7.10.** Soit  $n \geq 1$ . Déterminer les polynômes minimum et caractéristique de l'application

$$D: \mathbb{C}_{\leq n}[z] \rightarrow \mathbb{C}_{\leq n}[z] : p \mapsto Dp(z).$$

**Exercice 7.11.** Déterminer les matrices  $A \in \mathbb{R}_n^n$  telles que  $B = \left( \begin{array}{c|c} A & A \\ \hline 0 & A \end{array} \right)$  soit diagonalisable.

**Exercice 7.12.** Soient  $\alpha \in \mathbb{C}_0$  et  $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ . On désigne par  $T$  l'application

$$T: \mathbb{C}_{\leq n}[z] \rightarrow \mathbb{C}_{\leq n}[z] : p \mapsto p(\alpha) + \alpha p'(\alpha)z + \frac{\alpha^2}{2} p''(\alpha)z^2.$$

- (a) Montrer que  $T$  est linéaire.
- (b) Donner une représentation matricielle  $M$  de la restriction de  $T$  à  $\mathbb{C}_{\leq 2}[z]$  ainsi que son polynôme caractéristique.
- (c) Pour quelle(s) valeur(s) de  $\alpha$  la matrice  $M$  est-il diagonalisable ?
- (d) Déterminer le polynôme minimum de  $M$ .
- (e) Quel est le rang de  $T$  ? Montrer que  $\text{Im}(T) \oplus \text{Ker}(T) = \mathbb{C}_{\leq n}[z]$ .
- (f) Donner les polynômes minimum et caractéristique de  $T$ .

**Exercice 7.13.** Soient  $E$  un espace vectoriel réel de dimension finie et  $T \in \mathcal{L}(E)$ . On suppose que  $T$  possède un polynôme annulateur  $P$  vérifiant  $P(0) = 0$  et  $P'(0) \neq 0$ . Montrer qu'on a alors

$$\text{Im}(T) \oplus \text{Ker}(T) = E.$$

**Exercice 7.14.** Soit  $M \in \mathbb{C}_n^n$  et  $p \geq 1$ . Montrer que  $M$  est diagonalisable si et seulement si  $M^p$  est diagonalisable et  $\text{Ker}(M) = \text{Ker}(M^p)$ . Le résultat subsiste-t-il si on travaille dans  $\mathbb{R}$  ?